

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / KSBT-TTGDSK
V/v tăng cường truyền thông phòng,
chống bệnh liên cầu lợn sang người

Quảng Trị, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các Cơ sở khám, chữa bệnh;
- Các Trung tâm Y tế khu vực.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, hiện nay một số địa phương đã ghi nhận trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người, trong đó có số nhiễm gia tăng tại thành phố Huế, tỉnh Hưng Yên.

Bệnh liên cầu lợn do *Streptococcus suis* (*S.suis*) gây nên là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. *Streptococcus suis* được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng phổ biến nhất là ở nuôi lợn. Tỷ lệ mang *S.suis* không triệu chứng trong một đàn lợn khoảng 60%–100%. Vi khuẩn *S.suis* thường cư trú ở đường hô hấp trên, đặc biệt là ở mũi, ở đường tiêu hóa và ở cơ quan sinh dục. Hiện có 2 tuýp liên cầu lợn: Tuýp I, hay gây dịch bệnh lẻ tẻ ở đàn lợn con dưới 8 tuần tuổi. Tuýp II gây bệnh ở nhiều lứa tuổi khác nhau của lợn nhưng thường gây bệnh ở lợn thịt với các dấu hiệu viêm màng não, viêm màng tim, viêm phổi, viêm phúc mạc, viêm khớp, xuất huyết ở da, gây sảy thai và gây chết đột tử lợn. *S.suis* tuýp II thường gây bệnh cho người.

Thực hiện Công văn số 640/SYT-NVY ngày 07/8/2025 của Sở Y tế và đề chủ động phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính đề nghị các đơn vị tổ chức phối hợp, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người. Tổ chức tuyên truyền phổ biến về các thông tin về bệnh liên cầu lợn, các thông điệp, khuyến cáo về phòng chống bệnh liên cầu lợn. (có phụ lục kèm theo)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Lưu: VT, TTGDSK.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Thúy Hồng

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH LIÊN CẦU LỢN

(Kèm theo Công văn số /KSBT-TTGDSK ngày tháng năm 2025)

I. BỆNH LIÊN CẦU LỢN LÀ GÌ?

Bệnh liên cầu lợn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn *Streptococcus suis* gây ra. Vi khuẩn này thường có ở đường hô hấp, tiêu hoá và sinh dục của lợn. Người có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với lợn mắc bệnh hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn.

II. BỆNH LÂY SANG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

- Tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh hoặc lợn mang mầm bệnh khi mổ, giết mổ, chế biến.
- Ăn tiết canh, thịt lợn sống, chưa nấu chín kỹ.
- Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, qua da trầy xước hoặc qua niêm mạc.

III. BIỂU HIỆN CỦA BỆNH Ở NGƯỜI

* Biểu hiện của bệnh Liên cầu lợn

- Bệnh Liên cầu lợn có thời gian ủ bệnh ngắn, chỉ từ vài giờ đến 3 ngày.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), người mắc bệnh có các biểu hiện lâm sàng như: Sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, đau mỏi khắp người, rối loạn tri giác... xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể, đôi khi gây hoại tử.

- Một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hoá: sốt, đi cầu nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run... trước khi có biểu hiện của viêm màng não.

- Nếu không được phát hiện chữa trị kịp thời người bệnh sẽ nặng hơn kèm các biểu hiện: Sốc nhiễm độc, trụy mạch, cơ thể lạnh, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp tính, rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong.

Đối với những bệnh nhân hồi phục, bệnh vẫn có thể để lại những di chứng nặng nề như bị ù tai, giảm thính lực, điếc hoàn toàn.

- Trường hợp nặng có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng điếc vĩnh viễn.

IV. KHUYẾN CÁO PHÒNG TRÁNH BỆNH LIÊN CẦU LỢN Ở NGƯỜI

1. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện ăn uống vệ sinh, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch.

2. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết.

3. Khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống; hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc.

4. Dùng xà phòng rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng.

5. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh; không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác.

6. Người có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời.

V. THÔNG điệp

- *“Nói không với tiết canh - Bảo vệ sức khỏe gia đình”*

- *“Ăn chín, uống sôi - Phòng ngừa bệnh tật”*